



AVICULTURA

- **Broilers : 150 g** por metro lineal a lo largo de la línea de bebederos a los 21 días del comienzo de la crianza, sobre zonas húmedas o de fermentación de las camas. Repetir la aplicación en caso necesario.
- **Gallinas ponedoras : 100 g / m²** sobre la rejilla y zonas húmedas y de fermentación de las camas. Repetir la aplicación cada semana
- **Pavos, gansos y patos (hígados grasos) : 250 g / m²** en la línea de bebederos, en zonas húmedas o de fermentación de las camas. Repetir la aplicación en caso necesario.
- **Patos sobre rejilla : 100g / m²**

Prevención del golpe de calor : 300 a 500 g / m² sobre la cama a primera hora de la mañana

Cantidad aconsejada para una tanda en una nave de broilers de 1000 m²

- **300 kg en vaciado sanitario + 75 kg en presencia de los animales (sobre 250 m² de espacio libre entre las aves) = 375 kg**

¿ Cuánto BIOSUPER hace falta para 1 mes?

	Superficie de la nave		Cantidad por m ²		Cantidad total para la nave
En vaciado sanitario = (Superficie de la nave)		×	300g/m ²	=	
Según especie (Broilers, gallinas ponedoras, pavos...)		×	100 o 150 o 250 g/m ²	=	

Para más informaciones :
PRONOBEL FARMA S.L C/. La Granja 86, 2ª 28108
Pol.Ind de Alcobendas - MADRID
TEL : 91-4841452 / biosuper@pronobel.com

